

¿Quién debe recibir la vacuna contra el COVID?

Cualquier persona de 12 años o más debe recibir la vacuna. Para aquellos que tienen entre 12 y 17 años de edad, solo pueden recibir la vacuna Pfizer. Es la mejor manera de protegerte y proteger a tu familia.

¿Funciona la vacuna?

Ofrece una gran protección. En comparación con la vacuna anual contra la gripe, es dos veces más eficaz.

¿Es segura?

Sí, es segura. Se han administrado más de 390 millones de dosis en los Estados Unidos y las reacciones adversas son extremadamente raras. Los beneficios de la vacuna superan los riesgos potenciales.

¿Me hará sentir enfermo?

Después de la segunda dosis, existe una alta probabilidad de que se produzcan efectos secundarios similares a los de una vacuna contra la gripe (dolor en los brazos, dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio) durante unos días. Esto es de esperar y puede ser una buena señal de que su sistema inmunológico está funcionando.

¿Qué pasa con los nuevos relatos de malas reacciones, quién debería evitar la vacuna?

Si es alérgico al polietilenglicol (Miralax), no debe recibir la vacuna COVID actual.

Si desarrolla una reacción alérgica inmediata (urticaria, sibilancias) a la primera vacuna COVID, debe comunicarse con su proveedor antes de recibir la segunda inyección.

¿Qué pasa si estoy embarazada o tengo un sistema inmunológico debilitado?

Puedes recibir la vacuna. Habla de esto con tu médico primero si aún tiene dudas.

¿Cuánto cuesta y dónde puedo conseguirla?

La vacuna actual es gratuita. El condado de Alameda está trabajando actualmente con clínicas estatales y locales como AHS y farmacias locales para proporcionar la vacuna a nuestra comunidad. Para buscar la clínica de vacunas más cercana a usted, visite myturn.ca.gov.

¿Ofrecen las vacunas protección contra nuevas cepas de COVID-19?

Según la CDC, las vacunas autorizadas actuales ofrecen una fuerte protección contra nuevas cepas del virus COVID-19, incluida la variante Delta.

¿Quién califica para una vacuna de refuerzo?

Aquellos que recibieron su segunda dosis de Pfizer hace al menos 6 meses y cumplen con uno de los siguientes requisitos:

65 años o más

Residentes de un centro de cuidados a largo plazo

Personas (de 18 a 64 años) con afecciones médicas subyacentes **

Personas (de 18 a 64 años) con mayor riesgo de exposición y transmisión de COVID-19 debido al entorno laboral o institucional **

Personas con discapacidad

Grupos minoritarios raciales y étnicos

| Condiciones médicas subyacentes | Entorno ocupacional / institucional |
|---|--|
| <p>Cáncer</p> <p>Enfermedad renal crónica</p> <p>Enfermedades pulmonares crónicas, incluida la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), asma (moderada a grave), enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis quística e hipertensión pulmonar</p> <p>Demencia u otras afecciones neurológicas</p> <p>Diabetes (tipo 1 o tipo 2)</p> <p>Síndrome de Down</p> <p>Afecciones cardíacas (como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias, miocardiopatías o hipertensión)</p> <p>Infección por VIH</p> <p>Estado inmunodeprimido (sistema inmunológico debilitado)</p> <p>Enfermedad del hígado Sobrepeso y obesidad</p> | <p>Personal de primeros auxilios (trabajadores de la salud, bomberos, policía, personal de atención colectiva)</p> <p>Personal educativo (maestros, personal de apoyo, trabajadores de guarderías)</p> <p>Trabajadores de Agricultura y Alimentos</p> <p>Trabajadores de manufactura</p> <p>Trabajadores penitenciarios</p> <p>Trabajo del Servicio Postal de U.S.</p> <p>Trabajadores del transporte público</p> <p>Trabajadores de tienda de comestibles</p> |

| | |
|--|--|
| Embarazo Enfermedad de células falciformes o talasemia Fumador de tabaco, actual o anterior Trasplante de órganos sólidos o células madre sanguíneas Accidente cerebrovascular (Stroke) o enfermedad cerebrovascular, que afecta el flujo sanguíneo al cerebro Trastornos por uso de sustancias | |
|--|--|

Si recibí la vacuna Moderna o J&J, ¿puedo obtener el refuerzo de Pfizer?

Según las recomendaciones actuales de la CDC, las personas deben recibir un refuerzo de COVID-19 de la misma marca que su vacuna inicial. Aquellos que recibieron las vacunas Moderna o J&J deben esperar más orientación y recomendaciones de la CDC y la FDA.