

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Vaccin Cho Trẻ Em Từ 5-11 Tuổi (Cập nhật vào 11/9/21)

Hỏi: Tại sao con tôi cần được chích vaccin ngừa COVID-19?

- Lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em dường như thường nhẹ hơn so với người lớn, nhưng một số trẻ em vẫn bị ốm nặng và phải nhập viện. Nhiều trẻ em bị tử vong do những biến chứng của lây nhiễm COVID-19. Việc chích vaccin ngừa COVID-19 có thể giúp trẻ em không bị ốm nặng kể cả khi các em bị nhiễm vi-rút.
- Chích vaccin cho trẻ em có thể giúp bảo vệ những người khác trong gia đình, ví dụ như những em bé còn quá nhỏ chưa thể chích ngừa hay những người dễ nhiễm bệnh khác trong gia đình.
- Chích vaccin cho trẻ từ 5 tuổi trở lên giúp trẻ có thể được đến trường và tham gia một cách an toàn vào các hoạt động như chơi với nhau, chơi thể thao, và các hoạt động khác cần thiết cho phát triển thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ.

Hỏi: Chích vaccin ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi khác biệt như thế nào?

- Vaccin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi có những thành phần hoạt tính giống như vaccin cho thanh thiếu niên và người lớn. Thế nhưng, trẻ từ 5 - 11 tuổi sẽ được chích liều bằng một phần ba liều của người lớn, và sử dụng kim tiêm nhỏ hơn.
- Con cái của quý vị sẽ cần chích liều thứ hai của vaccin Pfizer ba tuần sau khi tiêm mũi thứ nhất.

Hỏi: Liệu vaccin có an toàn và hiệu quả với trẻ em không?

- Vaccin Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi đã được nghiên cứu trong một thử nghiệm lâm sàng với hơn 2.200 trẻ nhỏ từ 5-11 tuổi, tuân thủ những quy trình phê chuẩn tương tự như tất cả các loại vaccin khác dành cho trẻ nhỏ.
- Thử nghiệm lâm sàng cho thấy chích vaccin ngừa COVID-19 giúp trẻ em tạo ra sức đề kháng chống lại vi-rút tương tự như với người lớn. Vaccin hiệu quả 90,7% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 có triệu chứng ở trẻ nhỏ, có nghĩa là ít phải nhập viện vì lây nhiễm COVID-19 hơn.
- Cục Quản Lý Dược Phẩm Và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê chuẩn khẩn cấp cho phép sử dụng vaccin Pfizer với trẻ từ 5-11 tuổi vì vaccin Pfizer đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả.

Hỏi: Liệu vaccin có làm con tôi bị ốm không?

- Con quý vị có thể có một vài tác dụng phụ nhưng sẽ hết sau vài ngày. Những tác dụng phụ này là bình thường và đó là dấu hiệu cơ thể đang hình thành sức đề kháng.
- Những tác dụng phụ có thể có:
 - Tại vết chích trên cánh tay của con quý vị: Đau nhức, mẩn đỏ, sưng tấy.
 - Khắp cơ thể: Mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ bắp, lạnh, sốt, buồn nôn.

- Không khuyến cáo sử dụng thuốc aspirin cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Hãy hỏi bác sĩ của con quý vị về việc sử dụng thuốc giảm đau không có aspirin và những gì quý vị có thể làm tại nhà để làm dịu các triệu chứng của con quý vị sau khi chích vắc-xin.

Hỏi: Nếu con tôi có hệ miễn dịch suy yếu thì sao?

- Trẻ em có bệnh nền thì có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hơn khi nhiễm COVID-19 so với trẻ em không có bệnh nền, vì thế rất nên đưa con cái của quý vị đi chích vắc-xin ngừa COVID-19.

Hỏi: Chi phí chích vắc-xin ngừa COVID-19 là bao nhiêu và làm thế nào để tôi có thể hẹn lịch chích cho con của tôi?

- Vắc-xin hiện đang là miễn phí. Hạt Alameda hiện đang làm việc với các phòng khám tiểu bang và địa phương như Dịch Vụ Sức Khỏe Châu Á (Asian Health Services) và các nhà thuốc địa phương để cung cấp vắc-xin cho cộng đồng chúng ta. Để tìm phòng khám chích vắc-xin gần quý vị nhất, xin vui lòng truy cập myturn.ca.gov.
- Dịch Vụ Sức Khỏe Châu Á hiện đang hạn chế số buổi hẹn chích vắc-xin. Quý vị có thể gọi vào Đường Dây Trợ Giúp COVID của chúng tôi theo số (510) 735-3222 để xem có thể đăng ký chích vắc-xin không.

Hỏi: Liệu vắc-xin có thể bảo vệ trước các biến chứng mới của COVID-19 không?

- Vắc-xin Pfizer có khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước những biến chứng mới của vi-rút COVID-19, bao gồm cả biến chứng Delta.

Hỏi: Sau khi chích vắc-xin, trẻ em có còn cần tuân thủ các quy định ngừa lây nhiễm COVID-19 ở trường học không?

- Chích vắc-xin rất hiệu quả trong việc phòng ngừa những triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19, nhưng điều này không có nghĩa là con quý vị đã hoàn toàn miễn dịch với mọi lây nhiễm.
- Cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát rộng rãi, chúng ta cần tiếp tục sử dụng mọi công cụ có thể để giảm thiểu việc lây nhiễm vi-rút tại các địa điểm công cộng, như trường học. Điều này có nghĩa phải chích vắc-xin cho tất cả những người đủ điều kiện, đeo khẩu trang trong nhà, và đôi khi cả ngoài trời đối với tất cả những người từ 2 tuổi trở lên, tuân thủ giãn cách, rửa tay, cải thiện hệ thống thông gió trong trường học nếu có thể, và các biện pháp phòng ngừa khác.
- Giảm lây lan của COVID-19 giúp cộng đồng chúng ta khỏe mạnh và phòng ngừa vi-rút đột biến có thể tạo ra biến chứng nguy hiểm mới.

Hỏi: 1 đến 2 tháng nữa con tôi sẽ đủ 12 tuổi, tôi có nên chờ đến lúc đó không?

- Chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên trì hoãn chích ngừa cho trẻ em. Đây là cách hiệu quả nhất để bảo vệ con của quý vị khỏi bị COVID-19.

Hỏi: 1 đến 2 tháng nữa con tôi sẽ lên 5 tuổi, tôi có nên chờ đến lúc đó không?

- Trẻ em dưới 5 tuổi hiện chưa đủ điều kiện để chích vắc-xin ngừa COVID-19. Khi các em đủ điều kiện khi đã đủ 5 tuổi, các em nên chích vắc-xin ngay.

Hỏi: Thế còn trẻ dưới 5 tuổi thì sao?

- Hiện vắc-xin dành cho trẻ em dưới 5 tuổi, sử dụng liều lượng ít hơn nữa, vẫn còn đang thử nghiệm. Chúng tôi kỳ vọng Cục Quản Lý Dược Phẩm Và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) sẽ xem xét cho phép sử dụng vắc-xin cho trẻ dưới 5 tuổi vào đầu năm 2022.