





ASIAN HEALTH SERVICES

증상?




테스트 키트 사용

(2개 포함)



비디오 이용법

<https://vimeo.com/533752018>





5분 후 확인!

결과



5분 후 확인!





ASIAN HEALTH SERVICES

HEALTH CARE FOR ALL. ADVOCACY FOR THE UNDERSERVED.

코비드: 자가 가정용 테스트

본 테스트를 통해 귀하와 귀하의 가족의 집에서 신속한 코로나 감염 여부를 확인할 수 있습니다.

누가 검사를 받아야 하나요?

1. 코로나 유사 증상이 있는 경우: 콧물, 기침, 인후통, 발열, 두통, 근육통, 구토, 설사
2. 코로나 바이러스 양성자와 접촉한 가족 구성원
3. 최근 비행기, 기차 또는 버스로 다른 주에 방문한 가족 구성원
4. 실내모임에 참석한 가족 구성원

언제 테스트를 사용해야 하나요?

1. 증상이 있는 사람은 즉시 검사를 받아야 합니다.
2. 증상이 없는 사람은 노출 후 3~5일 후 검사를 사용하십시오: 여행, 실내모임 참석 후
3. 코로나 감염 후 증상이 호전되면 자가격리 5일 째에 해제가 가능한지 테스트를 사용하십시오.

테스트 사용 후 해야 할 일?

1. 양성일 경우 코로나 감염되었음을 의미합니다
 - a. 집에서 자가격리를 하셔야 하고 모든 사람들과 떨어져 있어야 합니다. 집에 있는 모든 사람들도 마스크를 착용해야 합니다.
 - b. 신분증과 검사결과를 함께 사진을 찍습니다. 다른 바이러스성 호흡기 감염과 마찬가지로 1주일 이내에 호전될이나 유력하나 다음과 같은 조건이 성립될 경우 의사에게 연락 하십시오.
 - i. 3~5일 후 증상 악화
 - ii. 호흡곤란, 안면 창백함/파란색 변색, 가슴 통증 또는 압박감, 혼란 또는 깨어 있을 수 없는 경우.
 - c. 집에 머물기, 다른 테스트 센터에서 추가적으로 테스트를 받을 필요가 없습니다.
2. 테스트가 음성일 경우 감염이 발견되지 않았음을 의미합니다.
 - a. 여전히 증상이 있을 경우 1~2일 후 검사를 반복할 수 있습니다.
 - b. 코로나 바이러스 감염자에게 지속적으로 노출 될 경우, 2~3일 이후 검사를 반복할 수 있습니다.
3. 테스트가 유효하지 않은 경우 폐기하고 새로운 샘플로 테스트를 반복하거나 테스트 센터에서 새로운 테스트를 받으십시오.